

4. Keväällä luonto herää

aineenvaihdunta	Eliö ottaa ympäristöstään aineita, joita se tarvitsee elintoimintoihinsa ja kasvuunsa. Lopulta eliö poistaa sille tarpeettomat aineet.
horros	Tila, jossa eläimen ruumiinlämpö laskee ja elintoiminnot hidastuvat. Esimerkiksi siili vaipuu talven ajaksi horrokseen.
keskilämpötila	Vuorokauden ylimmän ja alimman lämpötilan keskiarvo. Keskilämpötilojen avulla seurataan vuodenaikojen vaihtumista.
kiima-aika	Aika, jolloin eläin on seksuaalisesti aktiivinen. Naaraan kiima-aikana sen munasolun hedelmöittyminen on mahdollista. Katso: hedelmöittyminen.
muuttolintu	Lintulaji, joka muuttaa Suomesta pois talveksi.
naaras	Sukupuoli, joka tuottaa munasoluja ja jonka koiras hedelmöittää. Katso: koiras.
parittelu	Tapahtuma, jossa koiras päästää siittiösolut naaraan munasolujen luo.
reviiri	Eläimen elinalue, jonka se merkitsee esimerkiksi hajuaineilla.
selkärangaton	Eläin, jolla ei ole sisäistä tukirankaa eli selkärankaa. Sillä on ulkoinen kova kuori tai iho.
soidin	Parittelua edeltävä käyttäytyminen, jonka aikana koiras houkuttelee erilaisilla äänillä ja eleillä naarasta parikseen.
talvehtiminen	Kasvien talvehtiminen on kausi, jolloin kasvi on lepotilassa. Eläinten talvehtiminen tarkoittaa keinoja, joilla eläimet selviävät talvesta.
talviuni	Joidenkin nisäkkäiden unitila talvella. Talviunen aikana ruumiinlämpö ei laske, ja eläin saa energiaa ihon alla olevasta rasvakerroksesta. Esimerkiksi karhun talviuni.